

CONSENTIMIENTO DE ANESTECIA GENERAL



ME AN INFORMADO DE LO SIGUIENTE:

ANESTECIA GENERAL SE LOGRA AL ADMINISTRAR MEDICAMENTO ATRAVES DE ACCESO INTRAVENOSO. EL MEDICAMENTO TRANQUILIZA Y RELAJA AL PACIENTE DURANTE EL TRATAMIENTO. TÍPICAMENTE EL EFECTO DE ANESTECIA GENERAL SE DESCRIBE COMO ESTAR "DORMIDO/A" DURANTE LA CIRUGIA O TRATAMIENTO.

TAL MEDICAMENTOS GENRALMENTE TIENEN EL EFECTO DE CAUSAR AMNESIA(NO RECORDAR) DE LOS EVENTOS ALREDEDOR DE LA ADMINISTRACION DEL MEDICAMENTO, LO CUAL ES TEMPORAL.

AL IGUAL QUE CUALQUIER ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO, HAY RIESGOS POTENCIALES Y EL PACIENTE PUEDE EXPERIMENTAR EFECTOS SECUNDARIOS.

LOS MEDICAMENTOS USADOS PARA LOGRAR LA ANESTECIA GENERAL PUEDE, EN RAROS CASOS, CAUSAR UNA REACCION ALERGICA CUAL PUEDE MANIFESTARSE ATRAVES DE SINTOMAS TAL COMO: HINCHAZON, RONCHAS, NAUSEA, SUDOR Y VOMITO. EN CASOS MUY RAROS E IMPREDECIBLES LAS REACCIONES PUEDEN CAUSAR PELIGRO DE MUERTE.

EL DOCTOR Y EQUIPO DE TRATAMIENTO ESTAN ENTRENADOS EN EL USO DE ANESTECIA Y EL TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES.

LA CONDICION DEL PACIENTE DURANTE LA ANESTECIA SERA MONITOREADA POR EL DOCTOR, EL PERSONAL Y POR METODOS MECANICOS Y ELECTRONICOS.

SIGUIENDO LA CIRUGIA, HABRA UN PERIODO DE "RECUPERACION" DURANTE EL CUAL UNO PUEDE EXPERIMENTAR SENSACIONES DE INESTABILID, MAREOS Y UN POCO DE NAUSEA. SE LE PERMITIRA DESCANSAR DESPUES DE CIRUGIA.

DEBIDO AL POTENCIAL DE ALGUNOS EFECTOS RESIDUALES DE LOS MEDICAMENTOS DADOS DURANTE CIRUGIA, LOS PACIENTES NO DEBERAN MANEJAR VEHICULOS O MAQUINARIA EN LAS PRIMERAS 24 HORAS. ADEMAS, EL PACIENTE QUE HA TENIDO ANESTECIA GENERAL NO DEBE CONSUMIR BEBIDA ALCOHOLICA O MEDICAMENTO SEDATIVA POR 24 HORAS SIN ANTES AVISAR AL DOCTOR QUIEN DIO EL TRATAMIENTO O CIRUGIA.

HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE DISCUTIR LOS RIESGOS Y BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO CON ANESTECIA GENERAL Y TUVE CUALQUIER PREGUNTA CONTESTADA.

HABIENDO SIDO INFORMADO/A SOBRE EL TRATAMIENTO BAJO ANESTECIA GENERAL, YO DOY CONSENTIMIENTO PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO BAJO ANESTECIA GENERAL.

CONSENTIMIENTO DE CIRUGIA



COMPLICACIONES PUEDEN OCURRIR CON EL TRATAMIENTO DE LA CIRUGIA ORAL. ALGUNOS SON COMO SIGUEN:

1. DOLOR, INCHAZON, SANGRIA LEVE A MODERARDO Y MORETES SIGUIENDO LA CIRUGIA. EN LA MAYORIA DE LOS CASOS, LA HINCHAZON PUEDE SER MAS EL TERCER Y CUARTO DIA. ESTO ES COMPLETAMENTE NORMAL.
2. EXTRACCION DE LAS MUELAS DE ABAJO:
 - ES POSIBLE TENER ENTUMIDO O TENER UNA SENSACION DE HORMIGUEO EN EL LABIO, CACHETE O LENGUA DESPUES DE REMOVER LAS MUELAS. ESTO TIPICAMENTE ES TEMPORAL, PERO PUEDE SER PERMANENTE.
 - POSIBLE FRACTURA DE LA MANDIBULA.
3. EXTRACCIONES DE LAS MUELAS DE ARRIBA:
 - PROBLEMAS DEL SINUS.
4. IRRITACION EN LA AREA DONDE EMPEZAMOS LA LINEA INTRAVENOSA RESULTANDO EN DOLOR, MORETE O GRANOS.
5. RIGIDEZ DE LOS MUSCOLOS FACIALES. UN CAMBIO DE SU MORDIDA NORMAL. PROBLEMAS CON LA MANDIBULA, Y LA INHABILIDAD DE ABRIR LA BOCA COMPLETAMENTE.
6. DANO A OTROS DIENTES, INCLUYENDO RELLENOS O CORONAS.
7. DOLOR EN EL OIDO, CUELLO, CARA O CABEZA.
8. TENER REACCION NEGATIVA A LOS MEDICAMENTOS COMO NAUSIA O ALERGIA.
9. PUEDE HABER INSTANCIAS EN LAS QUE EL DOCTOR DECIDE QUE RECUPERANDO UNA PARTE PEQUENA DE LA RAIZ PUEDA CAUSAR MAS DANO EN EL AREA. SI ESTO ES EL CASO, EL DOCTOR PUEDE DECIDIR DEJAR LA PEQUENA PARTE DE LA RAIZ EN LA MANDIBULA. DEJAREMOS SABER AL CHOFER SI ESTO ES EL CASO.
10. INFECCION

ME HAN INFORMADO DE LAS POSIBILIDADES Y COMPLICACIONES DE LA CIRUGIA, DEL ANESTECIA, Y DE LOS MEDICAMENTOS. OTRAS COMPLICACIONES QUE NO ESTAN MENCIONADAS PUEDEN PASAR.

ENTIENDO QUE NO DEBO MEZCLAR LAS MEDICINAS RECETADAS CON BEBIDAS ALCOHOLICAS. TAMBIEN ENTIENDO QUE NO DEBO MANEJAR UN VEHICULO EL DIA DE LA CIRUGIA O CUANDO TOMANDO MEDICAMENTOS NARCOTICOS.

NO AUTORIZACION O GARANTIA SE HACE DEL RESULTADO DE LA CIRUGIA.